



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
NextGenerationEU

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



I° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

P.zza De Amicis,4 – 70026 MODUGNO



Circolare n.133

Ai Docenti della Scuola dell'Infanzia Plesso " De Amicis"
Ai Collaboratori Scolastici in servizio nel Plesso
Ai genitori degli alunni

E p.c.
Al DSGA
Al sito/Agli Atti
Al Dott. Palmieri G. coordinatore pedagogico
del centro ludico prima infanzia "I Passi di Alice"

Oggetto: segnalazione caso di scarlattina - scuola Infanzia Plesso " E. De Amicis".

A seguito dell'accertamento di un caso di scarlattina verificatosi in una sezione della scuola dell'Infanzia De Amicis, si richiamano le principali norme di profilassi previste nel caso in oggetto:

- autosorveglianza sanitaria per 7 gg a partire dall'ultimo contatto con il caso di scarlattina, ovvero il giorno 08/03/2024 (ultimo giorno di frequenza scolastica del caso).
Si ricorda che la malattia si trasmette per via aerea tramite goccioline respiratorie. La sorveglianza sanitaria consiste nel rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre ed eventuale esantema.
- consultare il proprio medico curante Pediatra per richiedere, a giudizio del medico, l'effettuazione del tampone faringeo per la ricerca dei germi comuni e per eventuali ed idonee prescrizioni.

Misure di igiene ambientale a cura del personale scolastico:

- **il personale docente** provvederà ad areare frequentemente l'aula utilizzata;
- **i collaboratori scolastici** provvederanno a igienizzare e disinfettare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavori ed i giocattoli con i prodotti disinfettanti in loro dotazione.

Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un'informativa sulla scarlattina.

DEFINIZIONE

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A.

DESCRIZIONE

Come ci si contagia. Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente

parlando. Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione. In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

Contagiosità. In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

La prevenzione. L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate.

Cosa fare quando si verifica un caso. Essendo una malattia batterica si cura con idonei antibiotici, è sempre bene consultare il medico.

Rischio di diffusione nella scuola. La diffusione in ambito scolastico si contrasta con la diagnosi e il trattamento precoce del caso.

Riammissione a scuola. Un bambino può tornare in comunità non prima di 48 ore dall'inizio della terapia antibiotica, in ogni caso quando ritorna ad essere in buone condizioni di salute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Laura Castellana

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993*